

Quels sont les conséquences de la perte d'une dent?

La perte d'une ou plusieurs dents entraîne des désordres très importants.



Ces dernières peuvent se déchausser,



Basculer, se déplacer,



Entrainant des caries et des problèmes de gencives



Pour éviter cela, il est recommandé de remplacer la dent par une couronne sur implant, un bridge ou Stellite, afin de stabiliser les dents et de prévenir les mouvements dentaires indésirables.

CONTACTEZ-NOUS



03.21.37.92.68



25 Rue Victor Hugo
62220 CARVIN



clinique-dentaire-
carvin.fr



Cliniqueportesdunord



CLINIQUE
PORTES DU NORD

CONSEILS POST- EXTRACTION

Une équipe passionnée,
bienveillante et à l'écoute.
Investie pour votre santé et
votre plus beau sourire!

clinique-dentaire-
carvin.fr



5. Il est habituel de constater **quelques filets de sang** dans la salive pendant 2 ou 3H. Au besoin **remettre une compresse** et comprimer en mordant à nouveau pendant une heure.

6. **Respecter l'ordonnance** de médicaments et **ne pas prendre** de produit contenant de **l'aspirine**.

7. **Préférer une alimentation molle**, éviter les aliments **comportant des grains** (mûres, semoule, noisettes) qui pourraient se glisser dans la plaie. **Ne pas boire ou manger trop chaud**. Essayer de **mastiquer du côté opposé** à l'extraction.



1. **Conserver la compresse** en place pendant **15 minutes** après l'extraction

2. **Ne pas faire de bains de bouche** pendant 48h, **ne pas toucher la plaie** avec le doigt ou la langue. **Ne pas cracher, ne pas se rincer** la bouche abondamment pour ne pas risquer de faire saigner.

3. **Ne pas consommer d'alcool** et **ne pas fumer** pendant 2 jours minimum.

4. Se reposer et éviter tout exercice.



8. **Consulter** votre praticien si des **douleurs persistent** plus de 48H et **s'intensifient**.

9. **Prévenir rapidement** votre praticien si le **saignement est abondant**, ou si l'on crache de gros caillots de sang. **En attendant, remettre une compresse**, exercer une forte pression dessus et **éviter la position allongée**.

10. Si possible **sucer de la glace** ou **appliquer une vessie de glace** sur la joue, la maintenir appliquée pendant 2 minutes toutes les 10 minutes.